

# 放置雙頭 J 型引流管須知

## 一、目的：

1. 避免大於 2 公分之結石經電震波碎石術後碎石卡住輸尿管，造成輸尿管阻塞、疼痛、血尿。
2. 擴張輸尿管。

## 二、注意事項：

1. 此管一端置於腎盂，一端放於膀胱，防止移位，外觀並無法見得到管子。
2. 以膀胱內視鏡放入此管，因黏膜破損，可能有血尿及輕微疼痛，一般可透過多飲水及休息，改善上列症狀。
3. 每日飲水量至少 3000c. c. 。
4. 若有以下情況，醫師會考慮取下管子：
  - (1) 在 X 光透視下，認為結石不會堵塞輸尿管。
  - (2) 手術二週以上，不會造成尿液由膀胱逆流至輸尿管。
  - (3) 病人有嚴重疼痛情形。
5. 如果有發燒、發冷、嚴重腰痛，請主動回泌尿外科門診或急診診治。
6. 尿道口有管子脫出的情形，可自行取下，之後到泌尿科門診複診時，請主動告知醫師有此情形發生。
7. 此管放置約一個月，最長不超過三個月。

醫院總機：(049) 2624266 諮詢分機 ( 33060 )

~~竹山秀傳醫院關心您~~ 護理部(衛 S-22)